

Mospilan)))

ACETAMIPRID 20% SP

USO: insecticida.

INSTRUCCIONES PARA EL USO:

Preparación: Para la preparación del caldo de pulverización se deben seguir los siguientes pasos: 1- Cargar el tanque de la pulverizadora con agua limpia hasta la mitad de su capacidad. 2- Poner el agitador o retorno en funcionamiento y agregar la dosis indicada de MOSPILAN®. 3- Completar la carga de agua del tanque y mantener el removedor o el retorno en funcionamiento hasta la completa homogenización del preparado. Prepare lo que calcule que usará dentro de las 4 horas. No es conveniente dejar el preparado de un día para el otro.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación: Aplicar con equipos terrestres de alto volumen, mojando completamente el follaje, evitando el goteo. En manzano, mojar frutas, follajes y ramas de forma homogénea, con un mínimo de 2.000 litros de caldo por hectárea.

RECOMENDACIONES DE USO:

Utilizar la dosis mayor cuando se pretende obtener una mayor residualidad. Agregar coadyuvantes según las recomendaciones de uso.

Cultivo	Plaga	Dosis (g/hl)	Dosis (g/ha)	Momento de Aplicación
Manzano	Gusano de la pera y la manzana (<i>Cydia pomonella</i>)	12,5		Realizar los tratamientos de acuerdo al Servicio de Alarma, o desde la caída de pétalos, cada 12 días. Aplicar con bajas poblaciones de la plaga hasta 3 veces por temporada en un plan de rotación de productos. Se recomienda aplicar en las primeras generaciones.
	Chicharrita amarilla (<i>Edwardsiana crataegi</i>)	12,5		Aplicar el producto al observar presencia de ninfas en 5% de las hojas. Repetir el tratamiento según recomendación de su Ingeniero Agrónomo.
Duraznero	Pulgón del duraznero (<i>Myzus persicae</i>)	25 (*)	250 g como mínimo	Aparición de hembra fundatrix (*) Concentración mínima
Pera	Psílido del peral (<i>Cacopsyla pyricola</i>)	12,5		Aplicar el producto al observar la presencia de las primeras ninfas y sea evidente la producción de melaza.

Tomate Pimiento	<p>Pulgón verde (<i>Myzus persicae</i>)</p> <p>Mosca blanca (<i>Bemisia tabaci</i>, <i>Trialeurodes vaprariorum</i>)</p>	50/100		Aplicar cuando se observen los primeros ataques.
Poroto	<p>Mosca blanca (<i>Bemisia Tabaci</i>)</p>		100-125	Aplicar el producto en forma preventiva, a partir del estado fenológico vegetativo del cultivo conocido como V3, (emisión y completa elongación de la primera hoja trifoliada). Se recomienda cubrir el período comprendido entre la emergencia del cultivo y primera hoja trifoliada con el uso de insecticidas eficaces, los cuales pueden aplicarse tanto a la semilla (tratamiento de semilla), al suelo o directamente al follaje.
Algodón	<p>Pulgón del algodnero (<i>Aphys gossypi</i>)</p>		100-125	Aplicar al observar los primeros pulgones. Repetir el tratamiento según recomendaciones de su ingeniero agrónomo.

RESTRICCIONES DE USO

Entre la última aplicación y la cosecha deberá transcurrir: Duraznero y Manzano: 7 días; Pera: 20 días, Tomate y Pimiento: 1 día; Poroto y Algodón: 14 días.

Tiempo de reingreso al área tratada: 24 hs.

En caso de que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

COMPATIBILIDAD:

MOSPILAN es compatible con todos los insecticidas y fungicidas de uso corriente en los cultivos recomendados, salvo aquellos que posean metales pesados en su composición o productos químicos alcalinos fuertes como el caldo bordelés. De todas formas se recomienda una prueba de compatibilidad previa y la consulta con un Ingeniero Agrónomo.

FITOTOXICIDAD: No presenta efectos fitotóxicos a las dosis recomendadas.

CONSULTE UN INGENIERO AGRÓNOMO.