

A C A R I C I D A  
**SCARMITE**  
S U S P E N S I O N   C O N C E N T R A D A

**FENPIROXIMATO 5% SC**

**USO:** acaricida.

**INSTRUCCIONES PARA EL USO: Preparación:** Agitar bien el envase antes de su empleo. Para la preparación del caldo de pulverización se deben seguir los siguientes pasos: 1- Cargar el tanque de la pulverizadora con agua limpia hasta la mitad de su capacidad. 2- Poner el agitador o retorno en funcionamiento y añadir el contenido del envase del producto. 3- Completar la carga de agua del tanque y mantener el removedor o el retorno en funcionamiento hasta la completa homogenización del preparado. Prepare lo que calcule que usará en el día. No es conveniente dejar el preparado de un día para el otro.

**EQUIPOS, VOLÚMENES Y TÉCNICAS DE APLICACIÓN:** puede aplicarse con equipos a mochila, máquinas de alto volumen con lanza o turbinas. Como el producto no tiene acción sistémica es necesario cubrir totalmente con la solución acaricida ambas caras de las hojas y frutos.

**RECOMENDACIONES DE USO**

| Cultivo               | Plaga  | Dosis   | Momento de aplicación   |
|-----------------------|--|---|---|
| Flores y ornamentales | Ácaro tejedor<br>( <i>Tetranychus urticae</i> )      | 75 a 100 cm <sup>3</sup> /hl                        | La dosis mayor corresponde a infestaciones más severas o para prolongar el período de persistencia activa.  |
|                       | Arañuela roja Europea<br>( <i>Panonychus ulmi</i> )  |   |   |
| Manzano<br><br>Peral  | Ácaro tejedor<br>( <i>Tetranychus urticae</i> )      | 100 cm <sup>3</sup> /hl                             | Preventiva: Aplicaciones a mediados de Noviembre a la aparición de la plaga.  |
|                       | Arañuela roja Europea<br>( <i>Panonychus ulmi</i> )  | 50 a 75 cm <sup>3</sup> /hl                         | Curativa:<br>En Perales a la aparición de los primeros ácaros.<br>En Manzanos: con presencia de 2-3 ácaros en las hojas. La dosis mayor corresponde a infestaciones más severas o para prolongar el período de persistencia activa. |
| Té                    | Ácaro rojo del Té<br>( <i>Oligonychus yothersi</i> ) | 250 cm <sup>3</sup> /ha*<br>125 cm <sup>3</sup> /hl | Cuando se encuentre un promedio superior a 10 ácaros por hoja.  |

\*Se recomienda aplicar con un coadyuvante a la dosis de 30 cc/hl

**RESTRICCIONES DE USO:** Tiempo de reingreso al área tratada 24 Hs. El presente producto debe ser comercializado y aplicado conforme a la/s normativa/s provinciales y municipales correspondientes.

En caso de que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

**PERIODO DE CARENCIA:** Desde la última aplicación y la cosecha deben transcurrir 14 días para Manzano y Peral; y 21 días para el cultivo de Té.

**FITOTOXICIDAD:** No se producen casos de fitotoxicidad a las dosis recomendadas.

**COMPATIBILIDAD:** es compatible con la mayoría de los productos comúnmente usados en los cultivos de soja. No mezclar con productos alcalinos. Se recomienda hacer una prueba previa de compatibilidad y fitotoxicidad de cualquier mezcla que se intente realizar.

**AGITAR BIEN EL ENVASE ANTES DE UTILIZAR.**

**LA APLICACIÓN DEL PRODUCTO DEBE CONTAR CON EL ASESORAMIENTO DE UN INGENIERO AGRÓNOMO.**