



**USO:** insecticida.

**INSTRUCCIONES PARA EL USO:**

**PREPARACIÓN**

Llenar el tanque hasta la mitad de su capacidad con agua y agregar, manteniendo los agitadores en movimiento, el contenido del envase a la dosis recomendada.

**EQUIPOS, VOLÚMENES Y TECNICAS DE APLICACIÓN**

Aplicar TENCHU con equipos terrestres, procurando una cobertura uniforme del cultivo, prestando especial atención de alcanzar la totalidad de la planta. Cobertura: 50 a 70 gotas cm<sup>2</sup> tamaño de gota: 200-400 micrones. Uniformidad: 10-20% de coeficiente de variación.

**RECOMENDACIONES DE USO:**

**TENCHU** no presenta condiciones especiales de uso más que las indicadas. Evitar aplicar frente a condiciones ambientales desfavorables: temperatura mayor de 30° C, Humedad relativa menor de 40 %, Viento mayor a 15 KPH.

**Dosis y momento de aplicación:**

Cultivo	Plaga	Dosis	Momento de aplicación
Tomate	Mosca Blanca de los invernáculos ( <i>Bemisia tabaci-Trialeurodes vaporariorum</i> )	75-100 (g/hl)	Aplicación Foliar: realizar monitoreos periódicos hasta detectar la plaga. Aplicar al observar 2-5 moscas (adultos) por hoja y/o 2-5 ninfas por folíolo. Realizar 1 aplicación por ciclo de cultivo. Se recomienda rotar con ingredientes activos de otro grupo químico en las aplicaciones posteriores para evitar resistencia. Usar la dosis superior de Tenchu en casos de alta presión de plaga.
		300-400 (g/hl)	Aplicación en almácigo pre-trasplante: regar los plantines 1 a 2 días previo al trasplante con una solución que contenga la dosis recomendada de Tenchu cada 100 litros de agua. Durante el riego se debe procurar mojar bien todo el sustrato para lo cual se debe emplear una cantidad de solución

			<p>acorde al tamaño de la celda. Para bandejas de 168 celdas un volumen de 1.5 l/bandeja asegura una uniforme distribución del producto. Luego de la aplicación se debe procurar no volver a regar los plantines durante 8-10 horas, de manera que se permita la absorción del mismo. Usar la dosis superior de Tenchu en casos de alta presión de plaga.</p>
--	--	--	---

\*para todos los casos se recomienda aplicar el producto con 500 cc/ha de aceite vegetal

### **RESTRICCIONES DE USO**

Período de carencia: Soja 21 días. Tomate 1 día

Tiempo de reingreso al área tratada: 12 horas.

En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberán conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

### **COMPATIBILIDAD**

Se recomienda realizar una prueba de compatibilidad previa, consultar con un Ingeniero Agrónomo.

**FITOTOXICIDAD:** no se producen casos de fitotoxicidad a las dosis recomendadas. No se producen efectos sobre los cultivos subsiguientes.

**“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**