

# Amicor™

## RYNAXYPYR 20% SC

**USO:** insecticida

### RECOMENDACIONES DE USO

| Cultivo             | Plagas   | Dosis            | Modalidad de aplicación   | Momento de Aplicación  |
|---------------------|--|------------------|---|--|
| Manzanos<br>Perales | Gusano de la manzana<br>( <i>Cydia pomonella</i> )   | 20 cc/hl         | Aplicación foliar <b>cada 21 días</b> . En casos de muy alta infestación o limpieza de montes donde se utilizarán feromonas, aplicar <b>cada 14 días</b> .            | Aplicar según los Servicios de Alarma zonales y/o al observar caídas de mariposas en las trampas.  |
|                     | Gusano del broteo ó<br>Grafolita<br>( <i>Cydia molesta</i> )   | 25 cc/hl         |   |  |
| Durazneros          | Gusano del brote ó<br>Grafolita<br>( <i>Cydia molesta</i> )  | 25 cc/hl         |   |  |
| Soja                | Isoca medidora<br>( <i>Rachiplusia nu</i> )<br>Oruga de las<br>leguminosas<br>( <i>Anticarsia gemmatalis</i> )<br>Isoca militar tardía<br>( <i>Spodoptera frugiperda</i> ) | 25 - 30<br>cc/ha | Aplicación foliar <b>cada 14 - 28 días según especie y presión de plaga</b> . Aplicación foliar utilizando pulverizadores terrestres o equipos aéreos convencionales. | <b>Antes de floración (*):</b> desde 15 orugas > 1,5 cm por metro de surco y más de 20% de defoliación. Desde floración (*): desde 10 orugas > 1,5 cm por metro de surco y más de 10% de daño al follaje. Dosificar de acuerdo al desarrollo del cultivo y grado de infestación. |

|                       |  |                              |  |  |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--|
|                       | <p><b>Isoca bolillera</b><br/>(<i>Helicoverpa gelotopoeon</i>)</p> |                              |  | <p>Aplicación en estadios vegetativos, mientras las orugas están expuestas alimentándose de hojas y brotes. Umbrales de 0,5 a 1 oruga por metro de surco. Dosificar de acuerdo al desarrollo del cultivo y grado de infestación.</p>   |
|                       | <p><b>Falsa medidora</b><br/>(<i>Pseudoplusia includens</i>)</p>   | <p><b>50 cc/ha</b></p>       |  | <p>Ante indicios de presencia de la plaga en la zona (capturas de adultos, detección de pupas, etc) aplicar desde inicio del ataque cuando se observen 4-5 larvas por metro lineal de surco.</p>   |
| <p><b>Maíz</b></p>    | <p><b>Gusano Cogollero</b><br/>(<i>Spodoptera frugiperda</i>)</p>  | <p><b>75 - 100 cc/ha</b></p> | <p>Aplicación foliar <b>cada 10 - 14 días</b>. Aplicación foliar utilizando pulverizadores terrestres o equipos aéreos convencionales.</p> | <p>Aplicar al inicio de la aparición de la plaga, inmediatamente después de la eclosión de las larvas, cuando se observen los primeros daños (raspaduras).<br/>Aplicar cuando las larvas estén en la parte desplegada de las hojas. No aplicar cuando las larvas hayan ingresado al cogollo.<br/>Utilizar las dosis mayores en zonas de alta presión de plaga.</p> |
| <p><b>Girasol</b></p> | <p><b>Isoca medidora</b><br/>(<i>Rachiplusia nu</i>)</p>           | <p><b>30 - 50 cc/ha</b></p>  | <p>Aplicación foliar <b>cada 14 - 21 días</b>. Aplicación foliar utilizando pulverizadores terrestres o equipos aéreos convencionales.</p> | <p>Aplicar al inicio de los ataques, con umbrales de 5 orugas por metro de surco para lograr mayor impacto en las poblaciones aprovechando la residualidad. Utilizar las dosis mayores en zonas de alta presión de plaga.</p>  |

|                |   |                    |  |  |
|----------------|---|--------------------|--|--|
| <b>Tomate</b>  | <b>Polilla del tomate</b><br>( <i>Tuta absoluta</i> )                                       | <b>20</b><br>cc/hl | Aplicación foliar <b>cada 14 - 21 días</b> . Aplicación foliar utilizando pulverizadores terrestres, mochila manual o a motor.       | Aplicar al observar la presencia de plaga. En caso de ser necesario repetir cada 14 días. Entre generaciones de la plaga rotar con productos con distinto modo de acción.  |
| <b>Algodón</b> | <b>Oruga de la Hoja</b><br>( <i>Alabama argillacea</i> )                                    | 25 cc/ha           | Aplicación foliar <b>cada 14 - 21 días</b> . Aplicación foliar utilizando pulverizadores terrestres o equipos aéreos convencionales. | Aplicar al inicio de los ataques con umbrales de 1 oruga de hasta 1 cm por planta, y niveles de defoliación inferiores a 10% en el tercio superior de las plantas.   |
|                | <b>Oruga militar tardía o Gusano Cogollero del maíz</b><br>( <i>Spodoptera frugiperda</i> ) | 75-100 cc/ha       |  | Aplicar al inicio de la aparición de la plaga y comienzo de los ataques, con menos de 5% de botones florales o cápsulas dañadas. Monitorear cada 3 o 4 días.   |
| <b>Vid</b>     | <b>Polilla de la vid</b><br>( <i>Lobesia botrana</i> )                                      | 15-18 cc/hl        | Aplicación foliar cada 21 días, utilizando aspersiones terrestres  | Comenzar las aplicaciones al inicio de la oviposición. Bajo condiciones de alta presión de plaga, realizar una segunda aplicación a los 21 días posteriores. No realizar más de dos aplicaciones por temporada y dentro de una misma generación de la plaga (preferentemente durante la 2da o 3ra). Aplicar dentro de un programa de rotación de activos con diferente modo de acción. |

(\*) Umbrales de Tratamiento indicados por INTA. Consultar al INTA correspondiente a la zona donde se aplicará el producto los Umbrales de Tratamiento para la respectiva zona.