



BENCILADENINA 2% + GIBERELINA 2% SL

USO: fitorregulador.

INSTRUCCIONES PARA EL USO:

PREPARACIÓN: Agregue la cantidad necesaria a un tanque pulverizador, limpio, lleno hasta aproximadamente la mitad de su capacidad. Agitar mientras completa el resto de agua necesaria para lograr la proporción de 125 ml del producto cada 100 litros de agua. Use la solución dentro de las 24 hs. de preparada.

EQUIPOS, VOLÚMENES Y TÉCNICAS DE APLICACIÓN: Con equipos de alto volumen y alta presión, aplicar 900 - 1800 l/ha de la solución en una fina pulverización que asegure una cobertura completa y uniforme. Los mejores resultados se obtienen cuando se aplica la pulverización de Promalina como una fina neblina, logrando una buena cobertura.

Las aplicaciones deben realizarse desde el momento de plena floración hasta el comienzo de la caída de los pétalos.

-Aplicar cuando las condiciones del viento no causen excesiva deriva.

-Si la duración de la floración lo permite, aplicar en los momentos en que las condiciones climáticas aseguren la máxima absorción: humedad relativa elevada, tiempo fresco y condiciones que eviten el rápido secado de las gotitas de la aspersion sobre la superficie vegetal. Pulverizar en las primeras horas de la mañana o al atardecer.

-Después de llover espere a que las hojas y flores estén completamente libres de gotas en su superficie. La aplicación no se debe realizar cuando se espera una lluvia dentro de las 6hs. subsiguientes. Si esto ocurriera, se puede prever una disminución en la acción del producto.

-No aplique cuando la temperatura ambiente es inferior a 3°C o superior a 35°C.

RECOMENDACIONES DE USO:

Cultivo	Dosis	Momento de Aplicación
Manzano	2 l/ha	Desde el 50% hasta el 80% de apertura de la flor principal Las aplicaciones deben realizarse desde el momento de plena floración hasta el comienzo de la caída de los pétalos.

Cuando no se logra un buen mojado, utilice un agente humectante no iónico adecuadamente.

RESTRICCIONES DE USO:

Periodo de carencia: Exento

Tiempo de reingreso al área tratada: 24 hs.

No aplique más de una vez por estación de cultivo.

No aplique más de 1800 l/ha de solución.

En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberán conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia".

FITOTOXICIDAD:

No se producen casos de fitotoxicidad a las dosis recomendadas. No se producen efectos sobre los cultivos subsiguientes.

COMPATIBILIDAD:

No aplique Promalina en combinación con otros pesticidas, reguladores de crecimiento y/o fertilizantes foliares. Se recomienda realizar una prueba de compatibilidad previa, consultar con un Ingeniero Agrónomo.

CONSULTAR CON UN INGENIERO AGRÓNOMO.