



AMINOETOXIVINIGLICINA (AVG) 15% SP

USO: fitorregulador.

INSTRUCCIONES PARA EL USO

PREPARACIÓN: Llenar el tanque de la pulverizadora hasta la mitad con agua, agregar la cantidad necesaria de producto, y luego adicionar el adyuvante. Completar el faltante de agua, manteniendo en funcionamiento el sistema de agitación.

EQUIPOS, VOLÚMENES Y TÉCNICAS DE APLICACIÓN: Utilizar equipos para tratamiento de frutales, de alto volumen y presión, con manguera o turbina. Para optimizar la eficacia del producto, es necesaria una completa cobertura de los frutos y el follaje. No superar los 1000-1200 lts/ha de caudal en la aplicación, para mantener la concentración del producto cercano a 12,5 g ia/hl o 125 ppm.

RECOMENDACIONES DE USO

Evitar aplicar en presencia de condiciones climáticas desfavorables: temperatura > a 30 °C, Humedad Relativa < a 40 % y viento > a 15 KPH.

- Mantener el ph de la solución entre 6-8.
- No aplicar el producto en plantas bajo condiciones de estrés.
- No aplicar el producto si se esperan lluvias dentro de las 8 horas posteriores a la aplicación.

DOSIS Y MOMENTO DE APLICACIÓN:

Cultivos	Dosis	Momento de Aplicación
Manzano	830 (g/ha)	Aplicación única, 2 a 4 semanas antes de la fecha estimada de cosecha para la variedad. *

*Aplicar el producto siempre en mezcla con adyuvantes organosiliconados a razón de 0.05-0.1 % v/v.

RESTRICCIONES DE USO

Periodo de carencia para manzana: debe transcurrir un periodo de 7 días entre la aplicación de Retain y la cosecha.

Ingreso al área tratada: 12 horas.

En caso que el cultivo o subproductos se destinen a la exportación deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

COMPATIBILIDAD

El producto se aplica solo. Se recomienda realizar una prueba de compatibilidad previa. Consultar un ingeniero agrónomo.

FITOTOXICIDAD

No se observa a las dosis recomendadas.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO.