

STARKLE

DINOTEFURAN 70% WP

USO: insecticida.

INSTRUCCIONES PARA EL USO PREPARACION

STARKLE 70 WP es un polvo mojable. Para una correcta preparación, respetar las siguientes instrucciones:

- Agregar agua al tanque de la pulverizadora, hasta la mitad de su volumen. Poner a funcionar el sistema de agitación.
- Agregar la cantidad necesaria de **STARKLE 70 WP**, de acuerdo a la calibración realizada, directamente en el tanque y sin dilución previa. Con el sistema de agitación en funcionamiento, verificar que el producto se disuelva completamente.
- Completar el tanque con agua hasta el volumen final.
- Verificar que el sistema de agitación funcione en todo momento, para mantener la suspensión. Usar **STARKLE 70 WP** dentro de las 24 horas de haber realizado la mezcla de tanque, ya que la efectividad puede reducirse debido a la degradación del producto. Volver a agitar el caldo antes de reanudar la aplicación. Utilizar siempre agua limpia.

EQUIPOS Y VOLUMENES Y TECNICAS DE APLICACIÓN

Aplicar con equipos terrestres, procurando una cobertura uniforme del cultivo, prestando especial atención de alcanzar la totalidad de la planta. Cobertura: 50 a 70 gotas cm² tamaño de gota: 200-400 micrones. Uniformidad: 10-20% de coeficiente de variación.

RECOMENDACIONES DE USO

No presenta condiciones especiales de uso más que las indicadas. Evitar aplicar frente a condiciones ambientales desfavorables: temperatura mayor de 30° C, Humedad relativa menor de 40 %, Viento mayor a 15 KPH.

DOSIS Y MOMENTO DE APLICACIÓN

Cultivo	Plaga	Dosis (g/ha)	Momento de Aplicación
SOJA	Chinche verde (<i>Nezara viridula</i>) Chinche de la alfalfa (<i>Piezodorus guildinii</i>)	85*	Aplicar según los umbrales establecidos por el INTA según la especie presente, distancia de siembra y estado fenológico del cultivo.
	Chinche de los cuernos (<i>Dichelops furcatus</i>)	100 (*)	Aplicar en estadios reproductivos tempranos (R3-R4) para soja de primera época de siembra y en estadios reproductivos más avanzados (R4-R5) para soja de segunda época de siembra
	Alquiche chico (<i>Edessa meditabunda</i>)	85 (*)	Para alquiche, también se debe tener en cuenta el umbral establecido por INTA.
	Trips (<i>Caliothrips phaseoli</i>)	85 (*)	Aplicar cuando se observen 5 ninfas por folíolo.
ALGODÓN	Chinche Horcias (<i>Horcias nobilellus</i>)	85-100 (**)	Aplicar según las recomendaciones dadas por el INTA para esta plaga
ARROZ	Chinche del tallo (<i>Tibraca limbativentris</i>)	85 (*)	Aplicar según las recomendaciones dadas por el INTA para esta plaga.

(*) Aplicar con 0,5 l de aceite vegetal metilado.

(**)Aplicar con 0,2 l de aceite vegetal metilado.

RESTRICCIONES DE USO

Período de carencia: Entre la última aplicación de STARKLE 70 WP y la cosecha se deben dejar transcurrir para el cultivo de **Soja: 21 días**, para el cultivo de **Arroz: 20 días**, para el cultivo de **Algodón: 21 días**.

Tiempo de reingreso al área tratada: 12 horas.

En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberán conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

El presente producto debe ser comercializado y aplicado conforme a la/s normativa/s provinciales y municipales correspondientes.

COMPATIBILIDAD

Se recomienda realizar una prueba de compatibilidad previa, consultar con un Ingeniero Agrónomo.

FITOTOXICIDAD

No se producen casos de fitotoxicidad a las dosis recomendadas. No se producen efectos sobre los cultivos subsiguientes.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO