

FICHA DE TRANSPORTE
PROCEDIMIENTOS EN CASO DE EMERGENCIA

Clase 6.1 Líquido tóxico. Inflamable N° ONU 2903 Grupo de embalaje III		N° de ficha 35.749 
	PRINCIPIO ACTIVO: ACETAMIPRID 10 + ESFENVALERATO 10 EC SENASA N° 35.749 CARACTERISTICA: Insecticida piretroide	Uso Insecticida EC
EN CASO DE ACCIDENTE LLAMAR A ESTOS TELEFONOS LAS 24hs.		
TAS - Toxicología, Asesoramiento y Servicios. Tucumán 1544 (2000) Rosario		(0341) 424 – 2727
Unidad Toxicológica del Hospital de Niños "Dr. Ricardo Gutiérrez" S. de Bustamante 1399 (1425) Buenos Aires		(011) 4962 - 6666 / 2247 Fax (011) 4962 - 3762
Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico "Prof. A. Posadas" Av. P. Illía y Marconi (1706) Buenos Aires		(011) 4654 - 6648 (011) 4658 - 7777 [0800-333-0160]
Brigada de Riesgos Especiales de Bomberos de la Policía Federal Argentina		(011) 4644 2792 / 5
Summit-Agro Argentina S.A. Cerrito 1186 12° Piso (1010) Cdad. Autónoma de Buenos Aires		(011) 4811 - 2484

MEDIDAS GENERALES: Ubicar el vehículo fuera de la ruta para evitar mayores accidentes. Tener en cuenta la dirección del viento. "PELIGRO DE INTOXICACION". Parar el motor. No fumar. Evitar que el producto llegue a desagües o cursos de agua. Llamar a la Policía o Bomberos de la Población más cercana.

INCIDENTE SIN INCENDIO Retirar los recipientes dañados. Contener el derrame con tierra, arena o aserrín. Recoger las pérdidas y recurrir a expertos para la destrucción del producto. Equipo de Protección: Aparato respiratorio autónomo. Máscara.	INCIDENTE CON INCENDIO Extinguir con: AGUA - ESPUMA UNIVERSAL - POLVO SECO - DIOXIDO DE CARBONO. Equipo de Protección: Aparato respiratorio autónomo. Trajes adecuados.
--	---

NOTA AL MEDICO	PRODUCTO MODERADAMENTE PELIGROSO. CLASE II APLICAR TRATAMIENTO SINTOMATICO. LIGERA IRRITACIÓN CUTÁNEA Y MODERADA IRRITACIÓN OCULAR	
	INHALACIÓN:	Retirar al aire fresco. Si es necesario efectuar respiración artificial. Dar oxígeno. Llamar al médico.
TRATAMIENTO	PIEL:	Lavar con abundante agua y jabón. Llamar al médico.
	OJOS:	Lavar con abundante agua no menos de 15 minutos. Llamar al médico.
	INGESTION:	No inducir al vómito. No dar nada por boca si está inconsciente. Llamar al médico.